

Produktinformation: 20502

Flächendesinfektion

- mit guter Reinigungswirkung
- schützt und pflegt
- hochwirtschaftlich durch geringe Anwendungskonzentrationen
- aldehydfrei
- exzellente bakterizide, levurozide und begrenzt viruzide Wirksamkeiten bei optimalen Anwendungseigenschaften
- wirksam gegen Influenza, Noro, SARS-CoV-2 und MRSA
- Flächendesinfektionsmittel als Hochkonzentrat
- VAH- gelistet



CE
0044



RHEOSEPT-FD plus

Aldehydfreies flüssiges Flächendesinfektionsmittelkonzentrat

Produktbeschreibung

Desinfektionsmittel für den medizinischen Bereich auf der Basis kationischer Wirkstoffe, aldehydfrei, für die Flächendesinfektion, Wischdesinfektion und desinfizierende Flächenreinigung. Gelistet bei der VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.) nach den Richtlinien der DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e.V.). Für wasserfeste Oberflächen geeignet.

Anwendungsbereiche

Für den Einsatz in Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen, Pflegeheimen, Schwimmbädern und anderen öffentlichen Einrichtungen. Zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionserkrankungen.

Anwendungshinweise

Zur Desinfektion die Verdünnung gem. Dosiervorgaben (Produktinformation) beachten (z.B. 0,5%-60 Min., 1%-15 Min., 3%-5 Min.). Je nach vorgesehener Einwirkzeit ansetzen und auf die vorgereinigte Oberfläche dünn wischend auftragen. Je nach Einsatzbereich des Medizinproduktes ist nach der Desinfektion die Oberfläche sorgfältig mit Wasser nachzuspülen oder nachzuwischen, um Produktreste zu entfernen. Auf komplette Benetzung achten, damit Desinfektionsmittel bei langen Einwirkzeiten auch nach dem Auftrocknen wirksam sind. Stets frisch angesetzte Verdünnungen benutzen!

Wirkungsspektrum

Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (HIV, HBV, HCV, Influenza, SARS-CoV-2) und Noro.

Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
Einwirkzeit 5 Minuten	2% (20 ml/l)	bakterizid (EN13727) - hohe Belastung
Einwirkzeit 15 Minuten	0,5% (5 ml/l)	bakterizid (EN13727) - hohe Belastung
Einwirkzeit 15 Minuten	1% (10 ml/l)	bakterizid / levurozid (DGHM) - hohe Belastung
Einwirkzeit 15 Minuten	0,5% (5 ml/l)	bakterizid / levurozid (DGHM) - hohe Belastung
Einwirkzeit 5 Minuten	3% (30 ml/l)	bakterizid / levurozid (EN16615 / VAH) - hohe Belastung / Mechanik
Einwirkzeit 15 Minuten	1% (10 ml/l)	bakterizid / levurozid (EN16615 / VAH) - hohe Belastung / Mechanik
Einwirkzeit 60 Minuten	0,5% (5 ml/l)	bakterizid / levurozid (EN16615 / VAH) - hohe Belastung / Mechanik
Einwirkzeit 5 Minuten	3% (30 ml/l)	begrenzt viruzid (DVV / RKI - HIV, HBV, HCV, Influenza, SARS-CoV-2)
Einwirkzeit 60 Minuten	1% (10 ml/l)	begrenzt viruzid (DVV / RKI - HIV, HBV, HCV, Influenza, SARS-CoV-2)
Einwirkzeit 60 Minuten	1% (10 ml/l)	Norovirus (EN14476)

Zusammensetzung

In 100g sind enthalten: 5,0g Didecyldimethylammoniumchlorid; 1,9g Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride; 4,0g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-

diamin. Weitere Inhaltsstoffe: Komplexbildner, Alkohole, Duftstoffe.

Physikalisch-chemische Daten

- > pH-Wert (Anwendung) ca. 9
- > pH-Wert (Konzentrat) 11,0-11,5

Kennzeichnung gem. GHS

- > H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- > H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen.
- > H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- > P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- > P264 - Nach Gebrauch Hände mit Wasser gründlich waschen.
- > P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- > P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- > P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
- > P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
- > P321 - Besondere Behandlung (siehe Hinweise auf diesem Kennzeichnungsetikett).

Besondere Hinweise

Je nach Einsatzbereich des Medizinproduktes ist nach der Desinfektion die Oberfläche sorgfältig mit Wasser nachzuspülen oder nachzuwischen, um Produktreste zu entfernen. Chargennummer und Verwendbarkeitsdatum als gesonderten Aufdruck auf der Verpackung beachten. Verwendbarkeitsdatum: 48 Monate ab Herstellungsdatum.

Lieferformen

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
20502352	RHEOSEPT-FD plus Flasche 1000 ml	Karton
20502050	RHEOSEPT-FD plus Kanister 5 Liter	Kanister
20502100	RHEOSEPT-FD plus Kanister 10 Liter	Kanister

Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.rheosol.com - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: info@rheosol.com.

Registrierungen

Gelistet bei der VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.) nach den Richtlinien der DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e.V.). Dieses Medizinprodukt ist CE zertifiziert (CE 0044).

Umweltinformationen

Die NW-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.